

# Ďakujeme za vašu zodpovednosť

## Vakcína...

Vás chráni pred ochorením COVID-19, no ako každý liek môže mať sprievodné príznaky, ktoré väčšinou trvajú 2 - 3 dni.

## Najčastejšie možné vedľajšie účinky:

- bolesť a začervenanie v mieste vpichu
- pocit únavy a bolesť svalov a kĺbov
- bolesť hlavy
- zvýšená telesná teplota a/alebo horúčka
- príznaky podobné chrípke

## 1 - 3 dni po očkovaní dodržiavajte nenáročný program:

- aktívne necvičte
- zdržte sa náročnej fyzickej práce
- abstinujte
- oddychujte a vedľajšie účinky očkovania budú mierne a postupne odznejú

## V prípade výskytu vedľajších účinkov:

- Na miesto vpichu si prikladajte studené obklady.
- Pri teplote a príznakoch podobných chrípke oddychujte a pite viac tekutín.
- V prípade horúčky užite lieky na zníženie teploty (Paracetamol, Ibuprofen, Acylpyrin).
- Ak príznaky neustúpia do 3 dní, prípadne sa vyskytnú iné nežiadúce účinky alebo sa zmení váš zdravotný stav, kontaktujte svojho lekára.

Tím očkovacieho miesta BSK.